

**Nome Comercial:**

NEXIUM®

AstraZeneca

**Denominação Comum Internacional:**

Esomeprazol (sódico)

**Classificação Farmacoterapêutica:**

Grupo VII - Aparelho Digestivo

3 - Antiácidos e Antiulcerosos

b - Inibidores da Bomba de Prótons

**Apresentação:**

40 mg (frasco-ampola com pó liofilizado)

**Forma Farmacêutica:**

Pó para solução injectável.

**Via de administração:**

Intravenosa - I.V.

**Reconstituição:**

5 ml de cloreto de sódio a 0,9%.

**Administração:**

I.V. - administrar lentamente durante pelo menos 3 minutos.

Perfusão - diluir em 100 ml de cloreto de sódio a 0,9%.

Administrar durante 10 a 30 minutos.

**Estabilidade após Reconstituição / Diluição:**

Reconstituição:

12 horas à temperatura ambiente (25°C).

**Armazenamento:**

Temperatura ambiente.

Proteger da luz (conservar na embalagem original). No caso de exposição à luz artificial normal, mantém a estabilidade até 24 horas.

**Observações:**

A solução reconstituída ou diluída é límpida e ligeiramente amarelada.

**Bibliografia:**

Nexium® - Resumo das Características do Medicamento.